




# Avertissements agricoles

BRETAGNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35000 RENNES ☎ (99) 36 01 74



Publication périodique

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ÉDITION : CULTURES MARAÎCHÈRES, LÉGUMIÈRES ET POMMES DE TERRE

BULLETIN N° 136 -

24 OCTOBRE 1986

LAITUES : Présence de MildiouCHOUX : Prévenez les attaques d'*Alternaria*

## LAITUES

On observe actuellement des attaques de Mildiou sur plusieurs variétés de laitues dites résistantes.

Aussi :

- Assurez une protection régulière contre Mildiou, Botrytis et Sclérotinia (voir au verso le tableau des fongicides utilisables).
- Arrêtez tout traitement fongicide au stade 15-17 feuilles (comptez toutes les feuilles de plus de 3 cm<sup>2</sup>).
- Evitez d'arroser en période d'humidité prolongée, profitez au contraire des matinées ou des premières heures de l'après-midi ensoleillées.

- Éliminez régulièrement les salades qui "coulent" sur lesquelles s'implante ensuite la pourriture grise. Les recueillir dans un sac de plastique afin de limiter la dissémination des germes.

- Détruisez les déchets de végétaux à proximité des cultures même s'ils sont en plein air alors que la salade est sous serre.

- Effectuez un prélèvement de laitues pour analyse des résidus avant récolte. En cas de dépassement des tolérances admises, arrosez la culture (sauf s'il y a risque de Botrytis) et éliminez davantage de feuilles de base, lors du parage.

## CHOUX

Les conditions climatiques actuelles favorisent le développement des maladies sur le feuillage : Mildiou, *Alternaria*, Nervation noire.

Un traitement contre l'*Alternaria* est conseillé sur choux-fleurs d'hiver avec Rovral, (1,5 kg/ha) ou Kidan (3 l/ha) lorsque la dernière application remonte à plus de 3 semaines.

P.54  
.../...

## FONGICIDES A UTILISER CONTRE LES MALADIES DE LA LAITUE

Lors de chaque traitement en pulvérisation, il est recommandé d'utiliser une association de deux fongicides, l'un efficace contre le Mildiou et l'autre contre Botrytis et Sclérotinia. Les produits conseillés et les doses figurent dans le tableau suivant :

GROUPE CHIMIQUE	MATIERE ACTIVE		EFFICACE CONTRE :			
	Nom	Dose g/are	Mildiou	Botrytis	Sclérotinia	Divers
Dithiocarbamates	Mancozèbe	16	+++			
	Manèbe	16	+++			
	Zinèbe	20	+++			
Dicarboximides :						Rhizoctonia solani ++
- Phtalimides	Folpel*	15	+	+		
- Hydantoïnes	Iprodione	7,5		+++	++	
	Procymidone* (1)	7,5		+++	++	
	Vinchlozoline (1)	7,5		+++	++	
Diazines						Oïdium sur scarole ++
- Quinoxaline	Chinométhionate*	0,75				2 traitements : - stade 8 à 10 feuilles - stade 18 feuilles
Produits simples	Soufre mouillable	40 à 62			idem	
	Cuivre métal (Sulfate neutralisé)	20 à 25				- <u>sur scaroles</u> : contre maladies bactériennes - <u>sur laitues</u> : contre mildiou (Cu en assoc.) Attention au risque de phytotoxicité
Associations	contre le mildiou, en association avec mancozèbe : - Cymoxanil (Fulvax, Rémitine : 20 g/are) - Phoséthyl d'Aluminium (Rhodax : 25 g/are)					

Efficacité : + faible                      ++ moyenne                      +++ bonne

\* Interdit en Suisse sur salades

(1) Ne pas utiliser sur jeunes plantes, ni en association avec un insecticide : risque de phytotoxicité.

**REMARQUES :** - Bien respecter les doses prescrites

- Le Thirame n'est plus autorisé après plantation

**DERNIERE NOTE :** Bulletin n° 135 du 19 septembre 1986

## II - RESULTATS

Traitements Notations	BAYLETON TOTAL	IMPACT	SPORTAK	BAYLETON 5	BAYTAN 5	RUBIGAN	TRAIMIDAL	TEMOIN
% de plants infestés (15/04/86)	8	21	24	32	62	99	99	100
taille moyenne des plantes (mm) (30/06/86)	92	105	88	94	95	86	84	70

## III - CONCLUSION

- Le Bayleton total assure la meilleure protection, mais c'est l'Impact qui permet la meilleure croissance des pins.
- Deux ou trois applications en juillet-août, sont nécessaires, surtout lors des étés pluvieux.
- La mortalité des plants a atteint 20 % dans les témoins non traités... ce qui rend certaines années, la protection fongicide indispensable.

-----

P55